



नेपाल राजपत्र

नेपाल सरकारद्वारा प्रकाशित

खण्ड ६२) काठमाडौं, पुस २ गते, २०६९ साल (संख्या ३७)

भाग ३

नेपाल सरकार
शिक्षा मन्त्रालयको सूचना

शिक्षक सेवा आयोग (सातौं संशोधन) नियमावली, २०६९

शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ लाई संशोधन गर्न वाञ्छनीय भएकोले,

शिक्षा ऐन २०२८ को दफा १९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छ ।

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यी नियमहरूको नाम “शिक्षक सेवा आयोग (सातौं संशोधन) नियमावली २०६९” रहेको छ ।

आधिकारिकता मुद्रण विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागु हुनेछ।

२६९

खण्ड ६२ संख्या ३७ नेपाल राजपत्र भाग ३ मिति २०६९।९।२

(२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२. शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ को नियम १२ मा संशोधनः
शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ को नियम १२ को उपनियम (१)
पछि देहायका उपनियम (१क) र (१ख) थपिएका छन्-
“(१क) आयोगले शिक्षक नियुक्तिलाई व्यवस्थित गर्न विभिन्न चरणमा
विज्ञापन गर्न सक्नेछ ।
(१ख) उपनियम (१क) बमोजिम विज्ञापन गर्दा आयोगले पहिलो चरणमा
नेपाल सरकारबाट स्वीकृत दरबन्दीमा संवत् २०६३ साल वैशाख
११ गतेदेखि रिक्त रहेको शिक्षक पदको विज्ञापन गर्न सक्नेछ ।”

आज्ञाले,

सुरेश मान श्रेष्ठ

नेपाल सरकारको सचिव

आधिकारिकता मुद्रण विभागबाट प्रमाणित गरिएको छ।
२०६९

भाग ५

नेपाल सरकार कृषि मन्त्रालयको सूचना

नेपाल सरकारले बीउ बिजन ऐन, २०४५ को दफा १२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी राष्ट्रिय बीउ बिजन समितिको सिफारिसमा बीउ आलुको न्युनतम गुणस्तर देहाय बमोजिम तोक्ने निर्णय गरेकोले यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।

१. बीउ आलुको नामाकरण : बीउको स्तर नामाकरण देहाय बमोजिम हुनेछ :-
- (क) प्रजनन् बीउ / पूर्व मूलबीउ : तन्तु प्रजनन प्रविधिद्वारा उत्पादित स्वस्थ बीउ ।
- (ख) मूल बीउ / बेसिक १ : प्रजनन बीउ बिज वृद्धि गरी उत्पादन भएको बीउ ।
- (ग) प्रमाणित प्रथम स्तर/बेसिक २ : मूलबीउ बिज वृद्धि गरी उत्पादन भएको बीउ ।
- (घ) प्रमाणित द्वितीय स्तर/बेसिक ३ : प्रमाणित प्रथम स्तरको बीउ बिज वृद्धि गरी उत्पादन भएको बीउ ।
- (ङ) उन्नत बीउ : प्रमाणित द्वितीय स्तरको बीउ बिज वृद्धि गरी उत्पादन भएको बीउ, यसलाई खाने आलु उत्पादनको लागि प्रयोग गरिन्छ ।
- (च) सिडलिंग ट्युवर : बीयांबाट उत्पादन भएको पहिलो पुस्ताको ट्युवरलाई प्रमाणित द्वितीय स्तर सरह प्रमाणीकरण गरी यसलाई खाने आलु उत्पादनमा प्रयोग गरिन्छ ।

२. बीउ आलुको न्यूनतम गुणस्तर

(क) प्रजनन् बीउ

- (१) पहिलो श्रेणी : ५ ग्राम प्रति दाना भन्दा बढी तौल भएको ।
- (२) दोश्रो श्रेणी : १ ग्राम देखि ५ ग्राम प्रति दाना भन्दा कम तौल भएको ।
- (३) तेश्रो श्रेणी : ०.५ ग्राम देखि १ ग्राम प्रति दाना भन्दा कम तौल भएको ।
- (४) चौथो श्रेणी : ०.२ ग्राम देखि ०.५ ग्राम प्रति दाना भन्दा कम तौल भएको ।

(ख) मूल बीउ र प्रमाणित प्रथम, द्वितीय र उन्नत बीउ आलु

- (१) पहिलो श्रेणी : २५ देखि ५० ग्राम प्रति दाना भन्दा कम तौल भएको ।
- (२) दोश्रो श्रेणी : १५ देखि २५ ग्राम प्रति दाना भन्दा कम तौल भएको ।
- (३) तेश्रो श्रेणी : ५० देखि १०० ग्राम प्रति दाना भन्दा कम तौल भएको ।

(ग) सिडलिंग ट्युवर :

सिडलिंग ट्युवर बीउआलु आलु वर्णशंकर बीयां (Hybrid True Potato Seed or TPS) बाट उत्पादित पहिलो पुस्ताको मात्र हुनेछ । यसको ग्रेडिंग देहाय बमोजिम हुनेछ :-

- (१) पहिलो श्रेणी : १० देखि २० ग्राम प्रति दाना भन्दा कम तौल भएको ।
- (२) दोश्रो श्रेणी : ५ देखि १० ग्राम प्रति दाना भन्दा कम तौल भएको ।
- (३) तेश्रो श्रेणी : २० ग्राम प्रति दानाभन्दा माथि तौल भएको र ५ ग्राम प्रति दानाभन्दा सानो तौल भएको ।

(४)

आधिकारिकता मुद्रण विभागबाट प्रमाणित गरिएको मात्र लागु हुनेछ।

३. बीउ आलुको पृथकता दुरी : बीउ उत्पादन गर्ने खेतमा एक जातबाट अर्को जातको दुरी न्यूनतम ५ मिटर फरक हुनु पर्नेछ ।

४. प्रमाणिकरण कार्य विधी : बीउ आलुको बीउ प्रमाणीकरण गर्दा, खेत निरीक्षण र आलु दाना निरीक्षणको न्यूनतम स्तर भन्दा माथि रहेका बीउलाई प्रमाणीकरण गरिनेछ । सिडलिंग ट्युवर बीउ आलुको वर्णशंकर बीयां (TPS)बाट उत्पादित पहिलो पुस्ताको बीउलाई मात्र प्रमाणित द्वितीय स्तर सरह प्रमाणीकरण गरी यस्तो बीउलाई खाने आलु उत्पादनको लागि प्रयोग हुनेछ ।

५. निरीक्षण आँकडा तथा क्षेत्रफल :

बीउ रोपेको क्षेत्रफल	आँकडा संख्या	प्रति आँकडामा निरीक्षण गर्नुपर्ने संख्या	
		खडाबालीमा	खन्ने बखतमा दाना निरीक्षण
२ हेक्टर सम्म	५	१००	१००
२ हेक्टरदेखि ४ हेक्टर भन्दा कम	६	१००	१००
४ हेक्टरदेखि ६ हेक्टर भन्दा कम	७	१००	१००
६ हेक्टरदेखि ८ हेक्टर भन्दा कम	८	१००	१००
८ हेक्टरदेखि १० हेक्टर भन्दा कम	९	१००	१००
१० हेक्टर भन्दा माथि	१०	१००	१००

६ आलु बीयां (True Potato Seed) को न्यूनतम गुणस्तर

सिडलिंग ट्युवर उत्पादन गर्नको लागि बीयांको न्यूनतम गुणस्तर देहाय बमोजिम हुनेछ :-

(१) जलांश (Moisture)

: अधिकतम ७ प्रतिशत

(५)

आधिकारिकता मुद्रण विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागु हुनेछ।

खण्ड ६२ संख्या ३७ नेपाल राजपत्र भाग ५ मिति २०६९।१।२

- (२) उमारशक्ति (Germination) : न्यूनतम ८० प्रतिशत
 (३) शुद्ध बीउ (Seed Purity) : न्यूनतम ९८ प्रतिशत
 (४) अन्य बस्तु मिश्रण (Inner matter) : अधिकतम २ प्रतिशत

७. बीउ आलु खेतको न्यूनतम स्तर

७.१ खडावालीमा :-

शीसाघर, जालीघर तथा फिल्डमा खडावालीमा (Standing crop in glasshouse, screen house and field)

क्र.सं.	विवरण (Factor)	फिल्ड निरीक्षण	अधिकतम अनुमति प्रतिशत			
			प्रजनन बीउ	मूलबीउ	प्रमाणित बीउ	
					प्रमाणित १	प्रमाणित २
१	जातीय मिश्रण तथा नाभो विरुवा	दोश्रो निरीक्षण	०	०.०५	०.०५	०.१
२	आलुको पात दोब्रे भाईरस (PLRV)	जुनसकै बखत	०	०.५	०.७५	१
३	कडा मोज्याक वा पि.भि.वाई (PVY)	जुनसकै बखत	०	०.५	०.७५	१
४	नरम मोज्याक वा आलुका भाईरस एक्स, ए, एम, एस (PVX, PVA, PVM & PVS)	जुनसकै बखत	०	१	२	३
५	जम्मा भाईरस, सबै मिलाएर ^१	जुनसकै बखत	०	१	२	३
६	ओईले रोग वा ब्याक्टेरियल विल्ट ^२ (<i>Ralstonia solanacerarum</i>)	दोश्रो निरीक्षण	०	०	०	३ विरुवा प्रति हेक्टर
७	फ्युजारियम विल्ट (<i>Fusarium oxysporum</i>)	पहिलो र दोश्रो निरीक्षण	०	०.२	०.५	१
८	क्वलो फेंद कुहिने (<i>Erwinia spp.</i>)	पहिलो र दोश्रो निरीक्षण	०	०.२	०.५	१
९	भर्टिसिलियम विल्ट (<i>Verticillium spp. Dahliae</i>)	पहिलो र दोश्रो निरीक्षण	०	१	२	३
१०	राईजोक्टोनिया वा क्वलो खोष्टे (<i>Rhizoctonia solani</i>)	पहिलो र दोश्रो निरीक्षण	०	४	५	५
११	डहुवा (<i>P. infestans</i>)	चौथो निरीक्षण	०	डहुवा देखिएमा तुरुन्त बोटहरु हटाउनु पर्दछ ।		

(६)

आधिकारिकता मुद्रण विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागु हुनेछ।

खण्ड ६२ संख्या ३७ नेपाल राजपत्र भाग ५ मिति २०६९।१।२

द्रष्टव्य :

- (क) १ दुईवटा निरीक्षणहरूमा बढी भाईरस रोग प्रतिशतलाई अनुमतिको सिमा मान्नु पर्दछ ।
- (ख) २ ओइले रोग देखिएको क्षेत्रमा दिईएको सिमालाई मानिएको हो । ओइले रोगको शंका लागेमा सो बोट र वरिपरिका अरु बोटहरू समेत आलुका दाना लगायत सबै विरुवाका भागहरू हटाएको हुनु पर्दछ ।

७.२ बीउआलुका दानामा :

बीउआलुका दानाहरूको न्यूनतम स्तर (आलु खन्ने बखत, भण्डारण तथा भण्डारण पश्चात्को निरीक्षणमा)

क्र. सं.	विवरण (Factor)	अधिकतम अनुमति प्रतिशत				कैफियत
		पूर्व-मूलबीउ	मूलबीउ	प्रमाणित बीउ	प्रमाणित १ प्रमाणातर	
१	डुबवा रोगको कारणले दाना कुहिएको ^१ (<i>P. infestans affected tuber</i>)	०	१.०	१.०	१.०	संख्याको आधारमा
२	सुख्खा सडन ^१ (<i>Fusarium caeruleum</i>)	०	१.०	१.०	१.०	संख्याको आधारमा
३	भिजेको सडन ^१ (<i>Sclerotium rolfsi</i>)	०	३.०	३.०	३.०	संख्याको आधारमा
४	गिलो सडन (<i>Erwinia spp.</i>)	०	०	०	०.२	संख्याको आधारमा
५	खैरो पिपचक्के (<i>Ralstonia solanacearum</i>)	०	०	०	०	संख्याको आधारमा
६	ऐजर (<i>Synchytrium endobioticum</i>)	०	०	०	०	संख्याको आधारमा
७	धुले दाद ^१ (<i>Spiongospora subterranea</i>)	०	०.५	१	२	संख्याको आधारमा
८	साधारण दाद ^१ (<i>Streptomyces scabies</i>)	०	०.५	१.०	२.०	संख्याको आधारमा
९	कालो खोष्टे ^{१, २} (<i>Rhizoctonia solani</i>)	०	१.०	२.०	३.०	संख्याको आधारमा
१०	कुल जम्मा रोगको प्रकोप ^३ (<i>Total disease incidence</i>)	०	३.०	४.०	५.०	संख्याको आधारमा
११	आलुदानाको कुरूपता (<i>Deformities</i>)	०	०.५	१.०	१.०	संख्याको आधारमा
१२	भौतिकरूपमा खराबी अवस्था (<i>Mechanical damage</i>)	०	०.५	१.०	१.०	संख्याको आधारमा
१३	जातीय मिश्रण (<i>Varietal mixture</i>)	०	०	०	१.०	संख्याको आधारमा
१४	अन्य वस्तु मिसावट (<i>Inert materials</i>)	०	०.५	०.५	१.०	तौलको आधारमा
१५	चाउरिएको अवस्था (<i>Dehydration</i>)	०	१.०	४.०	४.०	संख्याको आधारमा

द्रष्टव्य -

- (क) १ कुनै बीउ लटको एउटा मात्र बीउआलुको दाना साधारण दादबाट संक्रमण भएको पाइएमा त्यो लटको संपूर्ण बीउ उचित विषादिले

(७)

आधिकारिकता मुद्रण विभागबाट प्रमाणित गरिन्छ, मात्र लागु हुनेछ।